


آمیودارون

AMIODARONE



هر آمپول:
150 mg
در **3 mL**

ضد آریتمی چندکاره (کلاس III)

در (VF/pVT) CPR (مقاوم به شوک)



بعد از زشوک سوم

300 mg IV/IO



بعد از زشوک پنجم

150 mg IV/IO



مکانیسم اثر



- سدیم بلوکر
 - پتاسیم بلوکر (اصلی)
 - آلفا بلوکر
 - بتا بلوکر
 - مهار کانال کلسیم
 - اثر روی گره SA و AV
- مؤثر در انواع آریتمی ها

در پروتکل انفوزیون

1

150 mg

در عرض 10 دقیقه

2

360 mg

در عرض 6 ساعت

3

540 mg

در عرض 18 ساعت



سپس 0.5 mg/min تا تکمیل دوز



نکات مهم پرستاری

مانیتور ECG مداوم (مراقب برادی کاردی و طولانی شدن QT) ✓

کنترل فشارخون، نبض و علائم حیاتی ✓

اصلاح الکترولیت ها (K^+ , Mg^{2+}) ✓

تزریق سریع می تواند باعث افت فشار شدید شود. ✓

ترجیحاً از خط مرکزی در انفوزیون طولانی استفاده شود. ✓

بررسی عملکرد کبد و تیروئید در مصرف طولانی مدت ✓

عوارض مهم



فیروز ریه
سرفه خشک
تنگی نفس



رسوب در قرنیه
تاری دید
هاله دور نور



اختلالات تیروئید
کم کاری یا
پرکاری تیروئید



Blue-man
تغییر رنگ پوست
به آبی-خاکستری



افت فشار
افت ضربان

تداخلات مهم

↑ دیگوکسین

↑ وارفارین

↑ INR

بتابلوکرها، دیلتیازم، وراپامیل
افزایش خطر برادی کاردی



NURSE TIP

آمیودارون نیمه عمر بسیار طولانی دارد (هفته ها تا ماه ها)
بنابراین عوارض آن ممکن است حتی بعد از قطع دارو هم باقی بمانند.